



# ANTIMENINGOCOCCO

## NOTA INFORMATIVA SULLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE

La Regione Toscana, visto il manifestarsi di numerosi casi di meningite e sepsi da meningococco in prevalenza di tipo C nei primi mesi del 2015, ha intrapreso una campagna di vaccinazione antimeningococcica con l'utilizzo del vaccino coniugato ACWY **offerto attivamente e prioritariamente ai ragazzi maggiormente a rischio ovvero dal compimento del 11° anno fino al compimento del 20° anno di età.**

Dal 21° anno al compimento dei 45 anni - dal momento che il rischio di malattia meningococcica si riduce progressivamente con l'età - la vaccinazione sarà resa disponibile a chi ne farà richiesta.

Dopo i 45 anni l'incidenza di malattia meningococcica si riduce ulteriormente (DGRT n 571 del 27.04.2015): è comunque consigliabile a chi lavora a stretto contatto respiratorio con il pubblico e a chi frequenta luoghi chiusi affollati.

I medici daranno priorità vaccinale agli assistiti affetti da immunodeficienza (con difese immunitarie basse).

### VACCINO SOMMINISTRATO NELLA CAMPAGNA 2015

Vaccino tetravalente coniugato con CRM197 oppure coniugato alla proteina vettore del tossoide tetanico contro sierogruppi A,C,Y,W135; non contiene adiuvanti né conservanti; è indicato per soggetti di età compresa tra 2 e 65 anni.

### DOVE RIVOLGERSI

I soggetti di età compresa tra gli 11 ed i 20 anni potranno rivolgersi al proprio pediatra o al proprio medico di famiglia. Al medico di famiglia, se interessati, potranno rivolgersi anche i soggetti di età compresa tra i 21 ed i 45 anni.

**Tutti i soggetti di età compresa tra gli 11 ed i 20 anni potranno effettuare la vaccinazione anche presso gli ambulatori dei centri vaccinali individuati in ogni Zona Distretto previo appuntamento tramite CUPTEL al numero 800 57 58 00 (ore 7,45 - 17,30).**

Per informazioni sulle sedi vaccinali è possibile chiamare il numero 800 61 3311 dalle ore 8 alle ore 18 dal lunedì al venerdì.

### MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO

Iniezione singola da 0.5 ml intramuscolare, preferibilmente muscolo deltoide.

### POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI SEGNALATI PIU' FREQUENTEMENTE

Nella sede di iniezione: dolore, eritema, indurimento, prurito. A livello sistemico: cefalea, nausea, dolori muscolari e articolari, capogiro, febbre. Si raccomanda di segnalare al medico vaccinatore ogni evento inatteso eventualmente osservato.

### CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE ALLA VACCINAZIONE

Ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti, o precedenti gravi reazioni avverse (anafilassi) allo stesso vaccino o a sue componenti.

### CONTROINDICAZIONI RELATIVE

Evento febbrile acuto.

Gravidanza: dati clinici non ancora sufficienti.